

OROFAR TABL. 24 TAB



Cena: 19,22 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | 1mg+1mg |
| Opakowanie | 24 tabl. (3 blist.po 8 szt.) |
| Postać | tabl.do ssania |
| Producent | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH |
| Substancja czynna | Benzoxonium chloride, Lidocainum hydroch |

Opis produktu

Lek Orofar wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwbólowe. Zawiera dwie substancje czynne:

- chlorek benzoksoniowy - zwalcza chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby powodujące bolesne infekcje gardła i jamy ustnej;
- chlorowodorek lidokainy - działa miejscowo znieczulająco, łagodzi ból, ułatwia przełykanie.

Orofar stosuje się:

- w zakażeniach gardła;
- w zakażeniach jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej - afty).

Lek łagodzi ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani..

Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).

Orofar zapobiega tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej.

Skład:

1 tabletkę zawiera:

Substancje czynne: 1 mg chlorku benzoksoniowego + 1 mg chlorowodoru lidokainy.

Pozostałe składniki to: sorbitol, celuloza mikrokrystaliczna, glikol, makrogol 6000, skrobia kukurydziana, sacharyna sodowa,

chlorek sodu, kwas cytrynowy jednowodny, aromat pomarańczowy, magnezu stearynian.

Dawkowanie:

Ssać powoli jedną tabletkę co dwie - trzy godziny. W przypadku nasilonej infekcji dawkę można zwiększyć do jednej tabletki co jedną lub

dwie godziny.

Nie należy przyjmować więcej niż dziesięć tabletek dziennie.

W przypadku leczenia aft należy pozwolić tabletkie rozpuszczać się powoli, w pobliżu miejsca zmienionego chorobowo.

Dzieci powyżej 6. roku życia nie powinny przyjmować więcej niż sześć tabletek dziennie.

Nie stosować leku Orofar bezpośrednio przed ani w trakcie jedzenia.

Przeciwwskazania:

Leku Orofar nie stosować jeśli pacjent jest uczulony na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku.

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Nie stosować u osób z tendencją do zachłystywania, zwłaszcza u osób powyżej 60. roku życia.

Kobiety w ciąży mogą stosować Orofar wyłącznie na zlecenie lekarza.

Nie stosować u kobiet karmiących piersią.

Lek zawiera sacharynę i sorbitol, jeśli wcześniej stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Uwaga:

W przypadku, gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka, lub ból utrzymuje się dłużej niż jeden tydzień, należy zwrócić się po poradę do lekarza.

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.