

Pirolam Intima Vag, 500 mg, tabl.dopochw., 1 szt

Cena: 31,23 PLN



Opis słownikowy

Producent

Opis produktu

Pirolam INTIMA Vag Clotrimazol 500 mg 1 tabletki dopochwowa

Pirolam INTIMA Vag – co to za lek i jak się go stosuje?

- **To lek na infekcje intymne** (grzybicę pochwy i zewnętrznych żeńskich narządów płciowych) w postaci tabletki dopochwowej.
- **Do stosowania powyżej 16. roku życia** (powyżej 12. roku życia pod nadzorem lekarza)¹.
- **Lek można stosować w ciąży** (w I trymestrze tylko po konsultacji z lekarzem) oraz w trakcie karmienia piersią.

Wybierz Pirolam INTIMA Vag!

- **Ekspresowa terapia dla kobiet, którym zależy na jak najszybszym leczeniu i wygodzie stosowania.**
- Pirolam INTIMA Vag = 1 tabletki dopochwowa = 1 aplikacja.
- Leczy najczęstsze objawy infekcji intymnej: ból, pieczenie, swąd i upławy.
- Dostępny bez recepty.

1. U młodzieży w wieku poniżej 16 lat, Pirolam Intima Vag można stosować tylko po konsultacji z lekarzem. W przypadku stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentek (po pierwszej miesiączce), zalecane dawkowanie jest takie samo, jak u dorosłych. Źródło: charakterystyka produktu leczniczego Pirolam INTIMA Vag.

Co zawiera lek Pirolam Intima Vag?

Substancją czynną leku jest klotrymazol.

Każda tabletką dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu.

Pozostałe substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, kwas adypinowy, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan.

Jak stosować lek Pirolam Intima Vag?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat

- Jedna tabletką dopochwowa, głęboko dopochwowo, przed snem.

Lek stosuje się w dawce jednorazowej. Tabletką dopochwowa powinna zostać umieszczona tak głęboko w pochwie, jak to możliwe.

Należy zapewnić wilgotne środowisko pochwy, aby tabletką rozpuściła się całkowicie. W przeciwnym wypadku nierozpuszczone części tabletki mogą wyslizgnąć się z pochwy.

Czas trwania leczenia

Lek Pirolam Intima Vag stosowany jest do leczenia w dawce jednorazowej.

W przypadku braku znaczącej poprawy po 7 dniach od zastosowania, należy skonsultować się z lekarzem w celu potwierdzenia przyczyny infekcji. W przypadku pogorszenia objawów, należy skontaktować się z lekarzem

