


POLOCARD TABL. 0,15 G 30 TAB



Cena: 13,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,15 g
Opakowanie	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Postać	tabl.powl.dojel.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

Polocard to lek w formie tabletek polecany do stosowania w profilaktyce chorób układu sercowo-kръżeniowego, a także w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia innych schorzeń przebiegających z zakrzepami w naczyniach.

Substancja czynna zawarta w leku Polocard - kwas acetylosalicylowy, podawany w małych dawkach hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

Skład:

Kwas acetylosalicylowy 150mg. Pozostałe składniki: skrobia kukurydziana, celuloza proszek, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E171), talk, sodu laurylosiarczan, czerwien koszenilowa, lak (E124), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan.

Dawkowanie:

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: 1 tabletkę 150mg na dobę.

Lek należy przyjmować doustnie, najlepiej w czasie lub po posiłku, popijając niewielką ilością wody.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu lub inne NLPZ; astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego; ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca, zaburzenia krzepnięcia krwi, jednoczesne stosowanie leków przeciwzakrzepowych, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ostatni trymestr ciąży.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.