

Pyramidon (Calcastin C) prosz.musuj. 0,5g+



Cena: 5,18 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,5g+0,3g+0,2g
Opakowanie	10 sasz.
Postać	prosz. musuj.
Producent	ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.
Substancja czynna	Acidum acetylsalic. Acid.ascorb. Calcium

Opis produktu

Pyramidon (Calcastin C)

Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej

Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcii lactogluconas.

Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej:

Każda saszетка zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum), 300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) oraz 200 mg wapnia w postaci laktoglukonianu wapnia (1,55g Calcii lactogluconas).

Postać farmaceutyczna:

Proszek musujący.

Wskazania do stosowania:

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym, do stosowania doustnego w leczeniu objawów przeziębienia i grypy oraz: gorączki, bólów mięśni i stawów, bólów głowy w tym migrenowych, bólów zębów, nerwobólów. Wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne salicylany, kwas askorbowy, wapń lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Czynna choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego. Skazy krwotoczne, zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków przeciwzakrzepowych. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (w cukrzycy, mocznicy, tężyczce). Znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ciężka niewydolność nerek, wątroby, serca. Ostatni trymestr ciąży. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie podawać dzieciom do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowej. Nie podawać jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

