

Radirex 0,5 g 10 tabl. TABL. 10 TAB

Cena: 9,87 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.
Producent	WROCLAWSKIE ZAKLADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Substancja czynna	Rhei radix

Opis produktu

Radirex ® tabletki, 10 tabl.

Tabletki Radirex są produktem leczniczym roślinnym stosowanym tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania:

Radirex stosuje się tradycyjnie jako środek przeczyszczający w zaparciach.

Stosowanie:

Doustnie: dorosłym i dzieciom powyżej 12 roku życia 2 tabletki jednorazowo, najlepiej przed snem. W razie potrzeby dawkowanie można zwiększyć do 3 tabletek dziennie. Działanie przeczyszczające następuje po 6-8 godzinach.

Najodpowiedniejszą dawką indywidualną jest najmniejsza dawka potrzebna do uzyskania miękkiego stolca.

W przypadku zażycia większej dawki leku Radirex niż zalecana:

Przedawkowanie leku może spowodować gwałtowną biegunkę, prowadzącą do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, z typowymi następstwami jak m.in. zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśniowe. Przy przedawkowaniu należy doprowadzić do zbilansowania płynów i elektrolitów w ustroju.

Przeciwwskazania:

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, niedrożność jelit, atonia jelit, ostre i przewlekłe choroby zapalne jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), zapalenie wyrostka robaczkowego, guzki krwawnicze, zapalenie kłębuszków nerkowych, kamica szczawianowa, biegunka, odwodnienie i zaburzenia

elektrolitowe oraz bóle brzucha o niejasnej etiologii.

Skład:

1 tabletkę zawiera:

Substancja czynna: Rhei radix pulveratum (sposzkwany korzeń rzewienia) – 513,5 mg

Substancje pomocnicze: krospowidon, talk

1 tabletkę zawiera śr. 12,6 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na reinę.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.