

Ranigast MAX tabl.powl. 0,15 g 30 tabl.



Cena: 16,76 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Dawka | 0,15 g |
| Opakowanie | 30 tabl. |
| Postać | tabl.powl. |
| Producent | ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. |
| Substancja czynna | Ranitidinum |

Opis produktu

Ranitydyna, substancja czynna leku **Ranigast Max**, hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Lek działa szybko. Czas działania 1 tabletki wynosi około 12 godzin.

Wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu.

Składniki:

Substancją czynną leku jest: ranitydyna w postaci chlorowodoru ranitydyny.

Każda tabletkę zawiera 150 mg ranitydyny. Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: krospowidon, magnezu stearynian, celuloza mikrokryształiczna, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki: hypromeloza (Methocel E 15), lak z żółcieniem pomarańczową E 110, tytanu dwutlenek, triacetyna, talk.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 16 lat

W przypadku wystąpienia objawów niestrawności zwykle stosuje się 1 tabletkę 150 mg na dobę. W razie nawrotu dolegliwości można zastosować 1 tabletkę 150 mg 2 razy na dobę. Dobowa dawka leku nie powinna być większa niż 300 mg (2 tabletki).

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając niewielką ilością wody.

Leku nie należy stosować samodzielnie przez dłużej niż 2 tygodnie. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 2 tygodniach leczenia, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Dawkowanie w niewydolności nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min) wydalanie ranitydyny może być zmniejszone, co może

prowadzić do zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi. Hemodializa zmniejsza stężenie ranitydyny w surowicy. U pacjentów przewlekle dializowanych należy podać ranitydynę w dawce 150 mg bezpośrednio po dializie.

Przeciwwskazania:

Leku Ranigast MAX nie należy stosować w przypadku:

- gdy kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje uczuleniowe na ranitydynę lub na inny składnik leku,
- dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny poradzić się lekarza.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.