

Roztwór wodny jodu rozt.dostos.nask.rozt.d



Cena: 15,05 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 40 g |
| Postać | rozt.do stos.na sk.rozt.do pł. |
| Producent | WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORAT.FARMAC.COEL SPÓŁKA JAWNA E.Z.M. |
| Substancja czynna | iodi solutio aquosa |

Opis produktu

Roztwór wodny jodu stosowany zewnętrznie do odkażania skóry, przemywania drobnych zranień i otarć.

Po rozcieńczeniu wodą stosuje się do płukania gardła; po rozcieńczeniu gliceryną do pędzlowania migdałków.

Skład:

jod, jodek potasu

Stosowanie:

Zewnętrznie, jako środek antyseptyczny na skórę, roztwór nie rozcieńczony.

Do płukania gardła: 10 kropli roztworu na szklanekę (200 ml) wody.

Do usuwania nalotu z migdałków: 10 kropli na kieliszek (50 ml) gliceryny.

Doustnie wyłącznie w dawkach indywidualnie uzgodnionych z lekarzem.

Należy rozpuścić zalecaną ilość preparatu w szklance wody, mleka lub soku, aby uniknąć podrażnienia żołądka.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Może zaburzać badania czynnościowe tarczycy. Nie należy stosować ze związkami rtęci. Nie należy stosować przy nadczynności tarczycy, gruźlicy płuc, zapaleniu opryszczkowym skóry (choroba Duhringa), stosować u noworodków i niemowląt.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.