

Rub-Arom ung. 40 g MA-Z 40 G T



Cena: 20,64 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 g
Postać	maść
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Lek **Rub-Arom** to maść o miejscowym działaniu rozgrzewającym stosowana tradycyjnie do nacierania w bólach mięśniowych (naciągnięcia mięśni, bolesne skurcze mięśni), bólach stawowych (stany zapalne stawów) i nerwobólach (zapalenie korzeni nerwowych, rwa kulszowa). Preparat może być również stosowany do nacierania klatki piersiowej i pleców w infekcjach górnych dróg oddechowych (grypa, przeziębienie) przebiegających z katarzem, kaszlem oraz towarzyszącym bólem mięśni i stawów.

Skład:

100 g maści zawiera

Substancje czynne:

tymol - 0,25 g

lewomentol - 2,75 g

kamfora racemiczna - 5,0 g

olejek cedrowy - 0,75 g

olejek eukaliptusowy - 1,5 g

olejek terpentynowy z sosny nadmorskiej - 5,0 g. Inne składniki leku to: parafina stała, wazelina biała.

Sposób użycia:

Lek do stosowania na skórę, do smarowania i nacierania 1 do 2 razy na dobę.

Dorośli: bolące miejsca nacierać ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3 g).

Dzieci od 12 lat: nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 2 miarkom (3 g).

Dzieci od 7 do 12 lat: nacierać skórę pleców i klatki piersiowej ilością maści odpowiadającą 1 miarce (1,5 g).

Do opakowania dołączona jest miarka: 1 miarka odpowiada 1,5 g maści.

Odpowiednią ilość maści nanieść cienką warstwą na skórę i wcierać delikatnie aż do pełnego wchłonięcia. Nie stosować dłużej niż kilka dni

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Nie stosować w przypadku napadów drgawkowych w wywiadzie.

Nie stosować u dzieci poniżej 7 lat.

Lek należy stosować na ograniczoną powierzchnię skóry.

Nie stosować na okolice oczu i ust, na błony śluzowe, oparzenia oraz na skórę zmienioną chorobowo czy uszkodzoną.

W przypadku wystąpienia rumienia należy przerwać stosowanie leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przed zastosowaniem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.