


Septolux aer.do st.w j.ustnej 1,5 mg/1ml 3



Cena: 13,07 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1,5 mg/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	aer.do st.w j.ustnej
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

Septolux - aerosol do stosowania w jamie ustnej, gardle. Substancją czynną leku jest benzydamin, która zaliczana jest do grupy niesteroidowych .leków przeciwzapalnych. Działa miejscowo przeciwzapalnie i przeciwbólowo oraz znieczulająco i odkażająco. Septolux aerosol jest stosowany w przypadku:

- objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani;
- bólu związanego z zabiegami stomatologicznymi i chirurgicznymi w obrębie jamy ustnej i gardła;
- objawów zapalenia błon śluzowych jamy ustnej po radioterapii, a także po intubacji.

Skład:
1 ml roztworu zawiera substancję czynną: chlorowodrek benzydaminu 1,5mg oraz substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, sodu cyklamian, glicerol, sodu wodorowęglan, polisorbit80, etanol 96%, aromat mięty pieprzowej, kwas fosforowy stężony, wodę oczyszczoną.
Każda dawka aerozolu o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów chlorowodoru benzydaminu.

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
od 4 do 8 dawek aerozolu od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5 - 3 godziny.
Dzieci od 6 do 12 lat:
4 dawki aerozolu od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5 - 3 godziny.
Dzieci poniżej 6 lat:
1 dawka aerozolu na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5 - 3 godziny. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie przekraczać 4 dawek.

Przeciwwskazania:
Nie należy zażywać leku Septolux jeśli występuje nadwrażliwość na benzydaminę lub inne składniki leku.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.