

Slow-Mag B6 tabl.powl.dojel. 50 szt. TABL.



Cena: 19,21 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,064g Mg2+5mg
Opakowanie	50 tabl. (pojem.)
Postać	tabl.powl.dojel.
Producent	PRODUKCYJNO- HANDL.PRZED.FARMAC.CURTIS HEALTHCARE SP. Z O.O.
Substancja czynna	Magnez ch.hexahyd., Pyridoxini hydroch

Opis produktu

Slow-Mag B6 jest to lek stosowany w profilaktyce i stanach niedoboru magnezu i witaminy B6, wzmożonej drażliwości i podatności na stres wynikających z niedoboru magnezu, zaburzeniach rytmu serca, nadciśnieniu tętniczym, zaburzeniach nerwowo-mięśniowych, zaburzeniach w budowie tkanki kostnej, ciąży, okresie karmienia piersią, kamicy nerkowej szczawianowo-wapniowej, zaburzeniach przemiany lipidów we krwi, zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej, alkoholizmie, przy stosowaniu leków moczopędnych, przeczyszczających, doustnych środków antykoncepcyjnych. Uzupełniająco w bólach głowy (w tym migrenowych) i mięśni.

Połączenie magnezu i witaminy B6 nie tylko zwiększa wykorzystanie tego składnika mineralnego przez organizm, ale także zapobiega tworzeniu się złożeń szczawianowo-wapniowych w układzie moczowym. Składniki preparatu, dzięki obecności warstwy ochronnej powlekającej tabletkę, są uwalniane dopiero w jelicie cienkim, co pozwala zmniejszyć ryzyko zaburzeń żołądkowych.

Skład:

Substancja czynna: 1 tabl. powl. dojelitowa zawiera 535 mg sześciowodnego chlorku magnezu (64 mg Mg) i 5 mg witaminy B6.

Substancje pomocnicze: wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu starynian, otoczka bezcukrowa

Dawkowanie:

Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich rozgryzać ani dzielić. Doustnie.

Dorośli leczniczo: 2 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem przez 3 tyg., następnie 3 tabletki dziennie (wieczorem); profilaktycznie: 1 tabletką rano i 1 tabletką wieczorem.

Dzieci powyżej 12 roku życia: krótkotrwale, maksymalnie 3 tabletki dziennie w dawkach podzielonych.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu,
- Podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia),
- Znaczne niedociśnienie tętnicze,

- Ciężka niewydolność nerek,
- Nie stosować łącznie z lewodopą, a także z innymi preparatami magnezu i witaminy B6 lub doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi,
- Zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego.

Podczas stosowania leczniczych dawek leku mogą wystąpić jedynie niewielkiego stopnia przemijające zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, luźne stolce). Stosowanie bardzo dużych dawek może prowadzić do wystąpienia nadmiaru magnezu i witaminy B6 w organizmie i powodować wystąpienie: neuropatii obwodowej, biegunki, zaczerwienienia skóry, bradykardii, bezsenności, osłabienia mięśniowego, śpiączki.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.