

SMECTA PROSZ 3 G 10 TOR



Cena: 11,07 PLN

Opis słownikowy

Dawka	3,76 g
Opakowanie	10 sasz.
Postać	prosz.do sp.zaw.doust.
Producent	BEAUFOR IPSEN PHARMA
Substancja czynna	Diosmectite

Opis produktu

SMECTA,3 g 10 saszetek

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Smecta® jest naturalnym związkiem glinokrzemianu, którego mikrocząsteczki mają strukturę warstwową oraz dużą lepkość. Te cechy odpowiadają za możliwość wchłaniania toksyn bakteriowych i wirusowych oraz powlekania błony śluzowej przewodu pokarmowego zwiększając jej wytrzymałość na toksyny.

Smecta nie wchłania się z przewodu pokarmowego, wiąże wirusy i bakterie oraz ich toksyny a dzięki temu, iż nie hamuje naturalnego ruchu jelit szybko usuwa z organizmu drobnoustroje odpowiedzialne za powstanie biegunki.

Smecta® nie hamuje naturalnego ruchu jelit, tzw. pasażu jelitowego, w związku z tym nie opóźnia wydalania drobnoustrojów z przewodu pokarmowego, które są przyczyną biegunki.

Działanie:

Dzięki swojej specjalnej, warstwowej budowie Smecta® wykazuje zdolność absorpcji (wiązania) toksyn, wirusów i bakterii. W konsekwencji przyczyny biegunki zostają usunięte z organizmu. Dodatkowo Smecta® ma działanie mukoprotekcyjne (ochronne): powleka i chroni warstwę śluzową przewodu pokarmowego.

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Na początku leczenia, w przypadku ostrej biegunki, zarówno u dorosłych jak i u dzieci, można podwoić dawkę dobową.

Lek Smecta® najczęściej stosuje się:

Dla dorosłych:

3 saszetki na dobę

Zawartość saszetki należy rozpuścić w połowie szklanki wody. Zaleca się podawanie leku między posiłkami.

Dla dzieci:

Dawkowanie leku u dzieci powinno być wcześniej skonsultowane z lekarzem

Dzieci w wieku poniżej 1 roku: 1 saszetka na dobę,

Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 1 do 2 saszetek na dobę,

Dzieci w wieku powyżej 2 lat: 2 do 3 saszetek na dobę.

Zawartość każdej saszetki należy rozpuścić w 50 ml wody i podawać małymi porcjami w ciągu dnia.

Można też podawać po dokładnym wymieszaniu z półpłynnymi pokarmami: np. bulionem, przecierem z owoców lub jarzyn, gotowymi daniami w słoikach dla dzieci.

Czas trwania leczenia:

Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 2-3 dni, oraz w przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.