

# Supremin syrop 4 mg/5ml 200ml SYROP 0,004



Cena: 19,47 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	4 mg/5ml
Opakowanie	1 but.a 200ml
Postać	syrop
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Substancja czynna	Butamiratum

## Opis produktu

**Supremin** w postaci syropu zawiera jako substancję czynną cytrynian butamiratu, który jest nieopiodowym lekiem przeciwkaszlowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu poprzez hamowanie odruchu kaszlowego. Obok działania przeciwkaszlowego butamiratum nieznacznie rozszerza oskrzela

### Skład:

-substancją czynną leku jest cytrynian butamiratu.

5ml (1 łyżeczka miarowa) syropu zawiera 4 mg cytrynianu butamiratu.

-inne składniki leku to: metylu parahydroksybenzoesan, kwas benzoesowy, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, maltitol ciekły, aspartam, aromat karmelowo-pomarańczowy (E 34493), woda oczyszczona.

### Dawkowanie:

Podanie doustne.

Lek należy stosować przed posiłkami.

Do leku dołączona jest łyżeczka miarowa o pojemności 5 ml.

Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, lek najczęściej stosuje się:

### Dzieci:

od 2 do 6 lat: 1 łyżeczka miarowa (4mg) 3 razy na dobę

od 6 do 12 lat: 2 łyżeczki miarowe (8mg) 3 razy na dobę

Dzieci powyżej 12 lat: 3 łyżeczki miarowe (12mg) 3 razy na dobę

**Dorośli:** 3 łyżeczki miarowe (12mg) 4 razy na dobę

**Przeciwwskazania:**

Leku Supremin nie stosować w przypadku uczulenia na butamirat lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,

U pacjentów z fenyloketonurią.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem leku powinny poradzić się lekarza. Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży, lek może być stosowany jedynie w razie konieczności.

Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn należy zachować ostrożność, gdyż w rzadkich przypadkach może dochodzić do osłabienia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.