

# Tasectan Proszek d/stos.u dzieci saszet. 0



Cena: 31,89 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	0,25 g
Opakowanie	20 sasz.
Postać	saszet.
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Tasectan 250 mg 20 saszetek

#### Wskazania

Tasectan jest wyrobem medycznym stosowanym w celu przywrócenia fizjologicznych funkcji ścian jelita. Specyficzny skład wyrobu medycznego pomaga w kontrolowaniu i łagodzeniu objawów biegunki o różnej etiologii, takich jak napięcie powłok brzusznych i częste wypróżnienia. Wyrób medyczny działa skutecznie przez 12 godzin.

#### Działanie

TASECTAN zawiera połączenie żelatyny i kwasu taninowego, które działa w sposób mechaniczny chroniąc zmienioną zapalnie błonę śluzową jelita dzięki zdolności tworzenia proteinowej, przylegającej do błony śluzowej warstwy ochronnej, która tworząc kompleksy z mukoproteinami odpowiedzialnymi za miejscowy stan zapalny, ułatwia ich precypitację i wydalanie z kałem.

Taninian żelatyny, składnik wyrobu medycznego Tasectan, nie ulega zmianie w żołądku i działa poprzez tworzenie ochronnej warstwy błony śluzowej jelita zmniejszając częstotliwość zdarzeń i czas trwania biegunki.

Wyrób medyczny jest dostępny w postaci kapsułek przeznaczonych dla pacjentów dorosłych oraz w postaci proszku w saszetkach dla dzieci.

#### Skład

Proszek do stosowania dla dzieci: Taninian żelatyny

#### Działania niepożądane

Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych ani przeciwwskazań do stosowania wyrobu medycznego Tasectan.

## Dawkowanie

Rozpuścić zawartość saszetki w szklance wody; można także dodać do soku owocowego lub jogurtu

## Środki ostrożności

- Nie stosować wyrobu medycznego po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Nie wolno stosować jeśli saszetka jest otwarta lub uszkodzona.
- Pomimo tego, że działania niepożądane po zastosowaniu wyrobu medycznego Tasectan nie są znane, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży lub w pierwszych miesiącach karmienia piersią. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego w ciąży lub podczas karmienia piersią, zawsze należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku utrzymującej się biegunki lub podrażnienia jelit, należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła.
- Nie wolno zamrażać.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.