

TEST CHLAMYDIA*1 SZT.



Cena: 95,58 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	Farmabol Sp. z o.o.
Substancja czynna	-

Opis produktu

VIOLA SZYBKI TEST NA CHLAMYDIĘ

Test antygenowy na wykrycie *Chlamydia trachomatis* do wykonania w domu (= do samokontroli).

Jest to wysokiej czułości (85,7%) i specyficzności (98,3%) test do samokontroli na bakterię *Chlamydia trachomatis*. Bakteria *Chlamydia trachomatis* najczęściej rozprzestrzenia się poprzez seks waginalny, oralny oraz analny. Możliwe jest również, że kobiety w ciąży przenoszą chlamydię na swoje dzieci podczas porodu, powodując zapalenie płuc lub poważną infekcję oka u noworodków (zapalenie spojówek – oftalmię noworodkową).

Chlamydioza czyli choroba wywołana przez *Chlamydię trachomatis* jest uważana za jedną z najczęściej występujących chorób przenoszonych drogą płciową na świecie. Uważa się, że jest najczęstsza przyczyna niepłodności na świecie, której można by zapobiec. Jako choroba jest bezobjawowa u około 50% mężczyzn i co najmniej 70% kobiet.

Badanie pod kątem zakażenia Chlamydia trachomatis przeprowadza się za pomocą wacika dołączonego do zestawu testowego w drogach rodnych kobiety (pochwie). Test został zwalidowany klinicznie względem diagnostyki z użyciem PCR oraz przeprowadzono badanie czy osoby nie przeszkolone (tzw. „lay men”) potrafią poprawnie interpretować wyniki testu. Na podstawie tych badań test został dopuszczony do sprzedaży domowej (= do samokontroli).

Kto powinien się przetestować w kierunku zakażenia Chlamydia?

- Mężczyźni lub kobiety z objawami, które mogą wskazywać na infekcję.
- Partnerzy seksualni osób z potwierdzoną lub podejrzaną chlamydią.
- Wszystkie aktywne seksualnie osoby w wieku poniżej 25 lat, corocznie lub częściej, jeśli zmieniły partnera
- Osoby poniżej 25 roku życia, które były leczone z powodu chlamydii w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
- Osoby, które mają obawy dotyczące narażenia seksualnego. (Jeśli ekspozycja miała miejsce w ciągu poprzednich dwóch tygodni, przetestuj i powtórz dwa tygodnie po ekspozycji.)
- Osoby, które miały co najmniej dwóch partnerów seksualnych w ciągu ostatniego roku.
- Wszystkie kobiety zgłaszające się do przerwania ciąży.
- Wszyscy zgłaszający się do wenerologa lub ginekologa z objawami wskazującymi na zakażenie
- Matki niemowląt z zakażeniem chlamydiami (np. noworodkowe zapalenie spojówek lub zapalenie płuc).
- Kobiety, które mają zostać wyposażone w antykoncepcję wewnątrzmaciczną (IUCD) lub system domaciczny (IUS), które zostały zidentyfikowane jako zagrożone chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Wynik testu uzyskasz już po 15 minutach. W przypadku pozytywnego wyniku skontaktuj się ze swoim lekarzem w celu leczenia. Szybko zdiagnozowana chlamydia jest w większości przypadków szybko wyleczona z pomocą antybiotykoterapii dobranej przez lekarza.