

UNIBEN 1.5MG/ML SPRAY 30ML



Cena: 15,07 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|------------------------|
| Dawka | 1,5 mg/ml |
| Opakowanie | 30 ml (butelka) |
| Postać | aer.do st.w j.ustnej |
| Producent | ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA |
| Substancja czynna | Benzydaminum |

Opis produktu

Uniben zawiera substancję czynną -benzydaminę chlorowodorek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), która działa miejscowo przeciwzapalnie, przeciwbólowo, znieczulająco oraz odkażająco. Dzięki temu, że lek miejscowo wchłania się bardzo dobrze i osiąga dużą stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym, dolegliwości szybko ustępują. Lek jest dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.

Skład:

Substancją czynną leku jest benzydaminę chlorowodorek (1,5 mg na 1 ml leku)
Ponadto lek zawiera: glicerol, sacharynę sodową, sodu wodorowęglan, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbit 20, aromat miętowy (Aromat „fresh peppermint” 506041T), wodę oczyszczoną.

Dawkowanie:

Lek Uniben stosuje się miejscowo spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Dzieci poniżej 6 lat:

1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę.
Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.

Dzieci od 6 do 12 lat:

Jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli:

Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Jedna dawka leku o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów benzydamininy chlorowodoru.

Stosowanie leku Uniben nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub pozostałe składniki leku.

W razie ciąży lub karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.