

## Upsarin C x 20tbl TABL. 20 TAB



Cena: 29,54 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	0,33g+0,2g
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.mus.
Producent	BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Acidum acetylsalic., Acidum ascorb.

### Opis produktu

**Upsarin C** jest lekiem złożonym. Zawiera jako substancje czynne kwas acetylosalicylowy i kwas askorbowy (witaminę C). Kwas acetylosalicylowy działa przeciwzapalnie, przeciwwirusowo oraz przeciwbólowo. Kwas askorbowy czyli witamina C jest niezbędna w procesach oksydoredukcyjnych, odpornościowych i detoksykacyjnych zachodzących w komórkach organizmu. Dodatek w leku witaminy C jest korzystny w przebiegu chorób przeziębieniowych.

#### Skład:

1 tabletkę musującą zawiera substancje czynne: kwas acetylosalicylowy 330mg, kwas askorbinowy (witamina C) 200mg oraz substancje pomocnicze: glicyna, kwas cytrynowy, bezwodny sodu wodorowęglan, sodu benzoosan, powidon

#### Dawkowanie:

Dorośli: 1 do 2 tabletek jednorazowo. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobową dla dorosłych wynosi 3g kwasu acetylosalicylowego i 1g kwasu askorbowego. Nie należy stosować dawki większej niż 5 tabletek na dobę ze względu na zawartość witaminy C.

Osoby w podeszłym wieku: 1 do 2 tabletek jednorazowo. maksymalna dawka dobową dla osób w podeszłym wieku wynosi 2g kwasu acetylosalicylowego i 1 g kwasu askorbowego. Nie należy przyjmować dawki większej niż 5 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 12 do 15 lat: 1 tabletkę jednorazowo. W razie konieczności dawkę można powtórzyć co 4 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobową kwasu acetylosalicylowego wynosi 50 mg/kg mc. Nie należy stosować dawki większej niż 5 tabletek na dobę.

Jeśli pomimo przyjmowania leku dolegliwości bólowe utrzymują się ponad 5 dni lub gorączka ponad 3 dni należy zasięgnąć porady lekarza

Tabletkę należy rozpuścić w szklance wody, mleka lub soku owocowego i natychmiast po rozpuszczeniu wypić

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą  
Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.  
Skazy krwotoczne i zaburzenia krzepnięcia krwi.  
Ostatni trymestr ciąży.  
Okres karmienia piersią.  
Dna moczanowa.  
Kamica nerkowa.  
Czynne krwawienie: do jamy ciała, krwawienia z ran, w tym pooperacyjne.  
Pacjenci z napadami astmy oskrzelowej.  
Dzieci poniżej 12 lat.  
Ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z ulotką.