

Witamina C monovitan tabl.drażow. 0,1g 50t



Cena: 3,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,1 g
Opakowanie	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)
Postać	tabl.drażow.
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Substancja czynna	Acidum ascorbicum

Opis produktu

Witamina C monovitan to lek wskazany w profilaktyce i uzupełnianiu niedoboru witaminy C w organizmie w okresach rekonwalescencji po chorobach infekcyjnych, gojeniu ran po oparzeniach oraz u osób palących papierosy.

Lek można stosować pomocniczo w leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza, w stanach zapalnych skóry oraz błon śluzowych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego.

Witamina C bierze udział w procesach utleniania i redukcji w organizmie, uczestniczy w powstawaniu kolagenu, wpływa na elastyczność włosowatych naczyń krwionośnych, jest niezbędna do właściwego rozwoju chrząstki i kości oraz prawidłowego przebiegu gojenia się ran. Pobudza wytwarzanie prostacykliny działającej ochronnie na naczynia krwionośne i hamuje wytwarzanie tromboksanu sprzyjającego skurczowi i zatorom naczyń. Wykazuje właściwości przeciwutleniające, hamuje powstawanie nadtlenków lipidów (tłuszczów) oraz unieczynnia wolne rodniki nadtlenkowe. Jest niezbędna w przemianach hormonów nadnerczy. Pośrednio bierze udział w procesach przemian fenyloalaniny, tyrozyny, noradrenaliny, histaminy, kwasu foliowego, a także lipidów, białek i karnityny. W przewodzie pokarmowym zwiększa wchłanianie żelaza.

Skład:

witamina C, substancje pomocnicze

Dawkowanie:

Dorośli: leczniczo 500-1000mg na dobę; **zapobiegawczo** 200-500mg na dobę.

Dzieci od 5 roku życia: leczniczo 100-200mg na dobę.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w kamicy nerkowej, zaburzeniach metabolizmu żelaza, u dzieci poniżej 12 roku życia. Lek zawiera źródło fenyloalaniny i może być szkodliwy dla pacjentów z fenylotketonurią.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.